

Daniel Blanco



A

Daniel Blanco



B



Claudio Roig

C

Daniel Blanco




D

A) Domas de *Bolax gummifera* cerca de Laguna Pescado, Tolhuin (Tierra del Fuego); B) Cobertura de *Carex* sp. y tapiz basal de alta densidad de briofitas; C) Pastizal en bosque muerto por actividad de castores, Carbajal (Tierra del Fuego); D) Turbal de ciperáceas en cabecera del Lago Fagnano, Tolhuin.



A



B



C

Fotos: Daniel Blanco

A) Turbera ombrotónica de *Sphagnum magellanicum* con alta cobertura de murtilla (*Empetrum rubrum*), con presencia de charcas y bosque marginal de *Nothofagus pumila*; B) contacto entre *Sphagnum magellanicum* y *Sphagnum cuspidatum*, y C) isletas de *Marsippospermum grandiflorum* en turbera ombrotónica de *Sphagnum magellanicum*.



Daniel Blanco



Leonardo Collado



Victoria de la Balze



Victoria de la Balze



Leonardo Collado

A) Domo de *Sphagnum magellanicum* avanzando sobre bosque marginal de Ñire (*Nothofagus antarctica*). Otras especies que acompañan a *Sphagnum* en turberas ombrotáficas son: B) *Marsippospermum grandiflorum*, C) *Rostkovia magellanica*, D) *Tetroncium magellanicum* y E) *Empetrum rubrum*.



Fotos: Claudio Roig

A) Turbera de *Astelia-Donatia* con presencia de *Nothofagus betuloides*, y B) charcas irregulares ocupadas por *Tetroncium magellanicum* en turberas de *Astelia pumila*.